

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE MADAGASCAR :
MONIMIACEAE ET ANNONACEAE.

Par A. CAVACO.

1. — MONIMIACEAE

En revisant le genre *Tambourissa* Sonn. pour le fascicule des *Monimiacées* qui doit paraître dans la « Flore de Madagascar », j'ai trouvé dans le dossier du *Tambourissa Thouvenotii* P. Danguy 3 échantillons récoltés par le Professeur HUMBERT au sud-est du Mandrare, vers 1.000-1.400 m. d'altitude, qui présentaient des feuilles semblables à celles de certains *Uapaca* (Euphorbiacées) et des inflorescences racémiformes laxiflores à pédicelles longs, pendants, dépourvus de bractées. Ces caractères suffisent pour distinguer aisément ces 3 échantillons, qui constituent une bonne espèce nouvelle, du *T. Thouvenotii* qui en est affine.

***Tambourissa uapacifolia* Cavaco, sp. nov.**

Arbor. Folia opposita, obovato-oblonga, 10,5-15,5 cm. longa, 5-8,2 cm. lata, petiolata, petiolo 10-18 mm. longo, apice rotundata, basi cuneata, coriacea, nervis venisque subtus manifeste prominentibus supra immersis; juniores utrinque dense villosa, adulta ad nervos venasque pilosa ceterum glabra. Flores masculi caulini in inflorescentia racemosa dispositi; inflorescentiae 4-6 cm. longae, 8-florae, pedunculo piloso, pedicellis 17 mm. longis pilosis, flavescens; bractae 0; receptaculum depresso-globosum, tomentosum demum in lobos 4-valvatos fissum; stamina numerosissima. Flores feminei et fructus non visi.

Domaine du CENTRE : bassin supérieur du Mandrare (Sud-Est), col et sommet de Marosoui, forêt sur latérite de gneiss, alt. 1.000-1.400 m., HUMBERT 6604 (holotype, P).

2. — ANNONACEAE

***Xylopia Danguyella* Ghesq., nomen nudum, mss. in Herb., ex Cavaco et Keraudren.**

Arbor; ramuli novelli dense tomentosi. Foliorum petiolus 3-5 mm. longus; lamina coriacea, supra glabra, subtus parce pilosula, nervo medio piloso, lanceolata, 7-12 cm. longa, 2,5-4 cm. lata. Flores axillares solitarii vel fasciculati; pedunculus 8-12 mm. longus, tomentosus; calyx cupularis extra velutinus, 7-8 mm. diam., lobis 3; petala lanceolata, 16-18 mm. longa, 3-5 mm. lata, coriacea, interiora angustiora; stamina numerosissima

1,5 mm. longa; carpella 4-5; ovaria velutino-tomentosa, 1,5 mm. longa; stylus 2 mm. longus, plumatus; carpella matura 6 cm. longa, 2,5 cm. lata.

EST : environs de Périnet, SERVICE FORESTIER 2630.

CENTRE : forêt d'Analamazaotra, LOUVEL 220; THOUVENOT 94 (Typus).

OUEST : province de Diego-Suarez, forêt d'Ambre, URSCH 245. Endémique. Noms indigènes : Hazoambo, Fontsimavo.

Cette espèce se rapproche du *X. lemurica*, mais a les pétales beaucoup plus larges; quant aux feuilles elles ne sont pas lancéolées, mais plutôt ovales-elliptiques.

Popowia ambrensis Cavaco et Keraudren.

Frutex scandens; ramuli novelli pilosi demum glabrescentes. Foliorum petiolus 2,5 mm. longus, pilosus; lamina papyracea, supra glabra, subtus parce pilosula, oblonga, apice obtusa, basi rotundata. Flores solitarii vel bini; sepala ovata, pilosa, 4 mm. longa, 4 mm. lata. Petala exteriora ovata, 9 mm. longa, 8 mm. lata; interiora ovato-lanceolata, apice acuminata, 4 mm. longa, 2 mm. lata; stamina circit. 12; carpella circit. 6; ovarium pilosum, 0,8 mm. longum; stylus circit. 0,2 mm. longus, capitatus.

CENTRE : Camp d'Ambre, alt. 1.000 m., PERRIER 18826. Endémique.

Espèce bien distincte des autres *Popowia* par son calice foliacé. (Typus in Herb. Paris.).

Popowia Boivinii Baill. var. **brevipedicellata** Cavaco et Keraudren, nov. — *A var. Boivinii pedicellis brevioribus (4-8 mm. long.) differt.*

SAMBIRANO : Nossi-bé, PERRIER 4959 (Typ. var., P); Lokobé, Nossi-bé, SABOUREAU 4348.

Popowia Gerrardii (Baill.) Ghesq. ex Cavaco et Keraudren var. **microsperma** Ghesq. nomen nudum, msc. in Herb. — *A var. Gerrardii fructibus minoribus pedicellis longioribus (5 cm. long.) differt.*

OUEST : zone côtière de Mananjary, GEAY 7360 (Typ. var., P); BARON 5946.

Popowia caesia Diels var. **elongata** Ghesq. nomen nudum, msc. in Herb. — *A var. caesia foliis longioribus pedicellis longioribus differt.*

EST : plateau du Mrangaka, PERRIER 15134.

CENTRE : Mont Tsaratanana, PERRIER 15545 (Typ. var., P).

— Var. **subacuta** Ghesq. nomen nudum msc. in Herb. — *A var. caesia foliis acutatis pedicellis longioribus differt.*

OUEST : collines et plateaux calcaires de l'Ankarana, HUMBERT 18889 (P).